


Farmcell Usage Schedule for PADDY



Mixing Ratio Reference: Farmcell / Water
 Pump: 135ml : 20L Water
 Drone : 400ml : 60L Water

Reference Farmcell usage per Land size:
 1.0L / Hectare or
 0.4L / Acre atau
 0.3L / Relong




Precaution:

1. Use water without chlorine (Non-Chlorine Water).
2. Do not mix with pesticides or fertilizers.
3. Spray equipment must be used separately.

山东康耕农业发展有限公司

水稻 - 植物干细胞使用方法



							
	养地	泡种子 (8小时)	25~30天	52~56天	75~85天	收割	
稀释比率	1 : 300	1 : 300	1 : 500	1 : 150	1 : 150		
植物干细胞产品	 加底肥						
稀释比率用量 (兑 20公升水)	67毫升 Farmcell Soil Enhancement	67毫升 Farmcell Gold	135毫升 Farmcell Gold	135毫升 Farmcell Gold Plus	135毫升 Farmcell Gold Plus		


喷施方式: 灌根

使用范围: 1公升FARMCELL 对 1公顷地 (15亩)

1. 使用无氯水 (Non-Chlorine Water) 。
2. 请勿与其他农药或肥料复配使用。
3. 喷射器材必须独立使用, 喷洒过农药的器材不可混用。
4. 稀释后的原液必须在两天内使用。
5. 养地时添加有机底肥, 例如有机鸡粪肥或固有的方式。

JADUAL PENGGUNAAN FARMCELL

Untuk SAWAH PADI



Membajak

Rendam bijiran Padi selama 8 jam

Hari ke 25 - 30

Hari ke 52 - 56

Hari ke 75 - 85

Tuai Padi



Farmcell Soil Enhancement



Farmcell Gold



Farmcell Gold



Farmcell Gold Plus



Farmcell Gold Plus

Rujukan Nisbah Campuran
Farmcell / Air:
Pump : 135ml : 20L Air
Drone : 400ml : 60L Air

Keluasan Kegunaan
Farmcell::
1.0L / Hectare or
0.4L / Acre atau
0.3L / Relong

Perhatian:

1. Gunakan air tanpa klorin (Non-Chlorine Water).
2. Jangan campurkan dengan Ubat Racun atau baja.
3. Alat semburan mesti digunakan secara berasingan.